

1.5 Flächendesinfektion

Mittel	Wirkstoffe	Konzentration	Einwirkzeit	Wirkungsbereich
Incidin plus (Auslaufprodukt)	Glucoprotamin	0,5%. 1,0%	60 Minuten 30 Minuten	Ggf. Umstellung bei TBC erforderlich
Incidin Pro	2-Phenoxyethanol, N,N-bis-(3-Aminopropyl)dodecylamin, Benzalkoniumchlorid	0,5 % 2,0%	60 Minuten 30 Minuten	begrenzt viruzid, begrenzt viruzid plus
Puresept	Didecyldimethylammoniumchlorid, N-(3- Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (Diamin),	0,5 % 1,0 %	30 Minuten 5 Minuten	begrenzt viruzid
Terralin protect	Benzalkoniumchlorid 2-Phenoxyethanol Aminoalkylglycine	0,5 %	60 Minuten	
Descogen Liquid- Konzentrat	Caroat (Peroxidverbindung)	<u>für Tonometerköpfchen</u> 1,0 %	1 Minute	begrenzt viruzid plus
		<u>für KIK-Isoletten</u> 1,5 % für laufende Desinfektion	60 Minuten	
		<u>für KIK-Isoletten, Anästhesie-Badewanne</u> 3,0 % für Schlussdesinfektion	30 Minuten	viruzid
Terralin PAA (Flüssigkonzentrat)	Peressigsäure Wasserstoffperoxid Essigsäure	2,0 %	10 Minuten	sporizid
		<u>bei Tuberkulose</u> 2,0 %	5 Minuten	
		<u>Hepatitis A/E</u> 2,0 %	30 Minuten	viruzid
Trichlorol Desinfektion von Abflüssen bei 4MRGN	Tosylchloramide sodium Natriumlaurylsulfat Natriumchlorid Geruchsstoffe	2 Messlöffel Pulver direkt in den Abfluss geben	60 Minuten	
Sani Cloth Active (alkoholfreie Desinfektionstücher für empfindliche Flächen und Geräte)	Didecyldimethylammoniumchlorid	Gebrauchsfertig	30 Minuten (viruzid) Haltbarkeit nach Anbruch zwei Monate. Deckel gut verschließen. 5 Minuten	Viruzid bei geringer Belastung, für US-Sonden ist eine Hülle zu verwenden begrenzt viruzid (Papillomavirus)
Mikrozid universal Wipes (Desinfektionstücher für empfindliche Flächen und Geräte)	Propan-2-ol, Ethanol	Gebrauchsfertig	5 Minuten	begrenzt viruzid
			15 Minuten	begrenzt viruzid Plus,
Quartasept plus	Didecyldimethylammoniumchlorid	0,5% Ausschließlich für Milchküche (Lebensmittel)	60 Min.	bakterizid, levurozid
Fermacidal D2 PI 01/2019 VAH gelistet Bakt./lev. Anwendung im IVF-Labor und Behandlung	Didecyldimethylammoniumchlorid - Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-alkyldimethyl-, Chloride - Quaternäre Ammoniumverbindungen, Alkyl[(ethylphenyl)methyl] dimethyl-, Chloride	Gebrauchsfertig	15 Min.	bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid plus?